


AIDS 

世界艾滋病日

预防艾滋 珍爱生命 你我共同参与

Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced.



AIDS 

目录

CONTENTS

01

关于艾滋病

02

病因与临床表现

03

主要传播途径

04

预防艾滋病


05

世界艾滋病日


01

关于艾滋病

Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced.



01 关于艾滋病



所谓艾滋病(AIDS)是Acquired Immune Deficiency Syndrome的简称,即“后天免疫缺乏症候群”

艾滋病是由艾滋病病毒所引起的,艾滋病病毒又称为人类免疫缺乏病毒(Human Immunodeficiency Virus),简称HIV。

01 关于艾滋病


HIV是一种能攻击人体免疫系统的病毒。它把人体免疫系统中最重要CD4T淋巴细胞作为主要攻击目标，大量破坏该细胞，使人体丧失免疫功能。因此，人体易于感染各种疾病，并可发生恶性肿瘤，病死率较高。HIV在人体内的潜伏期平均为8~9年，在艾滋病病毒潜伏期内，可以没有任何症状地生活和工作多年。



02

病因与临床表现

Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced.



02 病因与临床表现

◆ 艾滋病病因

研究认为，艾滋病起源于非洲，后由移民带入美国。1981年6月5日，美国疾病预防控制中心在《发病率与死亡率周刊》上登载了5例艾滋病病人的病例报告，这是世界上第一次有关艾滋病的正式记载。1982年，这种疾病被命名为“艾滋病”。



02 病因与临床表现



HIV感染者要经过数年、甚至长达10年或更长的潜伏期后才会发展成艾滋病病人，因机体抵抗力极度下降会出现多种感染，如带状疱疹、口腔霉菌感染、肺结核，特殊病原微生物引起的肠炎、肺炎、脑炎，念珠菌、肺孢子虫等多种病原体引起的严重感染等，后期常常发生恶性肿瘤，并发生长期消耗，以至全身衰竭而死亡。



02 病因与临床表现

◆ 艾滋病临床表现

- 发病以青壮年较多，发病年龄80%在18~45岁，即性生活较活跃的年龄段。在感染艾滋病后往往患有一些罕见的疾病如肺孢子虫肺炎、弓形体病、非典型性分枝杆菌与真菌感染等。
- HIV感染后，最开始的数年至10余年可无任何临床表现。一旦发展为艾滋病，病人就可以出现各种临床表现。

02 病因与临床表现

一般症状

持续发烧、虚弱、盗汗，持续广泛性全身淋巴结肿大。特别是颈部、腋窝和腹股沟淋巴结肿大更明显。淋巴结直径在1厘米以上，质地坚实，可活动，无疼痛。体重下降在3个月之内可达10%以上，最多可降低40%，病人消瘦特别明显。

神经系统症状

头晕、头痛、反应迟钝、智力减退、精神异常、抽搐、偏瘫、痴呆等。

消化道症状

食欲下降、厌食、恶心、呕吐、腹泻、严重时可便血。通常用于治疗消化道感染的药物对这种腹泻无效。

皮肤和黏膜损害

单纯疱疹、带状疱疹、口腔和咽部黏膜炎症及溃烂。

肿瘤

可出现多种恶性肿瘤，位于体表的卡波济肉瘤可见红色或紫红色的斑疹、丘疹和浸润性肿块。


呼吸道症状

长期咳嗽、胸痛、呼吸困难、严重时痰中带血。

03

主要传播途径

Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced.



03 主要传播途径

艾滋病病毒的传播途径有三种，分别为血液传播、性接触传播以及母婴传播（垂直传播），由于其无法穿过结构和功能完整的皮肤，因此只能通过粘膜和皮肤破损部位进入人体。



血液传播



性接触传播



母婴传播
(又称垂直传播)

03 主要传播途径

➤ 血液传播

容易通过血液传播途径感染艾滋病病毒的高危人群包括注射吸毒者、非正规有偿献血者以及医护人员。

➤ 性接触传播

艾滋病病毒可以通过无保护性交（包括阴道性交、肛交和口交）进行传播。目前，我国艾滋病病毒最主要的传播途径即为性接触传播。性接触传播感染艾滋病病毒的高危人群包含男性同性恋者、性工作者及艾滋病病毒感染者的性伴侣。

➤ 母婴传播

滋病病毒可以通过胎盘、分娩或哺乳等途径，从感染艾滋病病毒的母亲传播到新生儿身上。


➤ 其它传播途径

- 污染而未消毒的注射器和针头
- 与艾滋病接触的职业人员

04

预防艾滋病

Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced.



04 预防艾滋病

1、学习艾滋病防治知识

普及宣传艾滋病的预防知识，了解传播途径和临床表现及预防方法。

2、安全性行为

加强道德教育，禁止滥交；避免与HIV感染者、艾滋病病人及高危人群发生性接触；在所有的性行为中使用安全套。

3、不要共用针头

如果需要诸如海洛因这样的麻醉剂，不要和别人共用针头，也不要使用已经被别人使用过的针头。医护人员遵循了一定的安全措施就可以避免艾滋病在病人和工作人员间、病人之间的传播。



04 预防艾滋病

4、避免不必要的血液暴露

如美容、文身、扎耳朵眼、修脚等操作行为，这些均有血液暴露，如果必须进行上述操作行为，不要图价格低廉的操作室或没有卫生合格证的机构做这种高危操作行为。

5、不共用生活用品

避免共用牙刷、剃须刀等物品。女性月经期要注意卫生。

6、注意外伤防护

工作中如有外伤，体育运动外伤等引起的流血一定要注意保护自己，在救护伤病员时，避免破损的皮肤接触伤员的血液。

7、避免母乳喂养

喂食母乳者新生儿感染HIV的几率会增加12%–14%，故不建议喂食母乳。

04 预防艾滋病

日常接触不会感染艾滋病!


- ◆ 在日常工作和生活中，与艾滋病、乙肝和丙肝病人或感染者的一般接触不会被感染。
- ◆ 艾滋病、乙肝和丙肝一般不会经马桶圈、电话机、餐饮具、卧具、游泳池或公共浴池等公共设施传播。
- ◆ 不会通过一般社交上的接吻、拥抱传播。
- ◆ 也不会通过咳嗽、蚊虫叮咬等方式传播。



05

世界艾滋病日

Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced.



05 世界艾滋病日

- ✓ 为增进人们对艾滋病的认识，世界卫生组织于1988年将每年的12月1日定为世界艾滋病日，号召世界各国和国际组织在这一天举办相关活动，宣传和普及预防艾滋病的知识。世界艾滋病日的标志是红丝带，象征着大众对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的关心与支持。
- ✓ 世界艾滋病日的宣传可以唤起人们对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的同情和理解，号召全球人民共同行动，支持艾滋病防治及反歧视方面的工作。我国有不同层级的组织，为艾滋病病毒感染者和艾滋病病人提供服务，共同促进了艾滋病防治工作的推进和艾滋病反歧视事业的发展。

05 世界艾滋病日



世界艾滋病日的标志是红丝带。红绸带标志的意义：红绸带像一条纽带，将世界人民紧紧联系在一起，共同抗击艾滋病，它象征着我们对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的关心与支持；象征着我们对生命的热爱和对和平的渴望；象征着我们要用“心”来参与预防艾滋病的工作。

05 世界艾滋病日

设立目的

- 第一，让人们都知道艾滋病在全球范围内是能够加以控制和预防的；
- 第二，让人们都知道，防止艾滋病很重要的一条就是每个人都要对自己的行为负责；
- 第三，通过艾滋病日的宣传，唤起人们对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的同情和理解；
- 第四，希望大家支持各自国家制定的防治艾滋病的规划，以唤起全球人民共同行动起来支持艾滋病防治及反歧视方面的工作

艾滋病群体
关爱

AIDS 

感谢您的观看

预防艾滋 珍爱生命 你我共同参与

Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced. Please write your text below. The size can be changed and the font can be replaced.

